

## Couverts végétaux d'interculture

### Caratérisation

Espèce : Moutarde blanche tardive

Famille : Crucifère

Dose de semis  
en pure : 9 kg/ha


Variété : VERTE, Anti nématode : TOPAS

PMG (en g) : 7

### Bénéfice culture suivante

Céréales :	+	
Légumineuses :	-	
Maïs :	+/-	AN = variété anti-nématodes
Betteraves :	--	AN ++

## Développement aérien et souterrain



Enracinement : Pivot

## Aptitude aux semis

Très précoce (avant 30 juillet) :	-
Précoce (30 juillet -15 aout) :	+
Intermédiaire (16 aout - 31 aout) :	++
Tardif (après 1er septembre) :	+
Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	++
Semis sous la coupe :	++
Semis avec semoir à dents :	++
Semis direct avec semoir à disques sur chaume :	+
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	+
Semis à la volée puis rouleau :	+/-

## Destruction

Gel :	+/-	Roulage (avant gel) :	++
Broyage :	++	Travail du sol (déchaumage) :	+
		Glyphosate :	+/-

### Phénologie

Photos et  
résultats  
d'essais



Biomasse :    + 125,6 % (4,2 T de MS/ha)  
Source essais VAL'EPI (nb ref : 3) en % de la moyenne (valeur absolue)

### Développement foliaire



Restitution d'azote (source MERCI) :    + 122,2 % (30,1 U/ha)  
en % de la moyenne (valeur absolue)

### Développement racinaire

