

Couverts végétaux d'interculture

Caratérisation

Espèce : Radis fourrager tardif

Famille : Crucifère

Dose de semis
en pure : 10 kg/ha

Variété : SUNDAY, KWS REAKTION

PMG (en g) : 12

Bénéfice culture suivante


Céréales :	+/-	
Légumineuses :	-	
Maïs :	+/-	AN = variété anti-nématodes
Betteraves :	--	AN ++

Développement aérien et souterrain

Elevée

Intermédiaire

Superficiel



Enracinement : Pivot

Aptitude aux semis

Très précoce (avant 30 juillet) :	++
Précoce (30 juillet - 15 août) :	++
Intermédiaire (16 août - 31 août) :	++
Tardif (après 1er septembre) :	+/-
Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	++
Semis sous la coupe :	++
Semis avec semoir à dents :	++
Semis direct avec semoir à disques sur chaume :	+
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	+
Semis à la volée puis rouleau :	+/-

Destruction

Gel :	-	Roulage (avant gel) :	+/-
Broyage :	--	Travail du sol (déchaumage) :	-
		Glyphosate :	-

Phénologie

Photos et
résultats
d'essais



Biomasse : ++ 150 % (6 T de MS/ha)
Source essais VAL'EPI (nb ref: 1) en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement foliaire



Développement racinaire



Restitution d'azote (source MERCI) : + 144,8 % (42 U/ha)
en % de la moyenne (valeur absolue)