

## Couverts végétaux d'interculture

### Caratérisation

Espèce : Moha

Famille : Graminée

Dose de semis  
en pure : 20 kg/ha


Variété : -

PMG (en g) : 2,3

### Bénéfice culture suivante

Céréales :	--
Légumineuses :	+/-
Maïs :	+/-
Betteraves :	+/-

### Développement aérien et souterrain



### Aptitude aux semis

Très précoce (avant 30 juillet) :	+
Précoce (30 juillet - 15 août) :	-
Intermédiaire (16 août - 31 août) :	--
Tardif (après 1er septembre) :	--
Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	+
Semis sous la coupe :	++
Semis avec semoir à dents :	+
Semis direct avec semoir à disques sur chaume :	+/-
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	+/-
Semis à la volée puis rouleau :	+/-

### Destruction

Gel :	+	Roulage (avant gel) :	++
Broyage :	+/-	Travail du sol (déchaumage) :	+/-
		Glyphosate :	++

### Phénologie

Photos et  
résultats  
d'essais



Biomasse : +/- 90 % (3,6 T de MS/ha)  
Source essais VAL'EPI (nb ref: 1) en % de la moyenne (valeur absolue)

### Développement foliaire



Restitution d'azote (source MERCI) : -- 44,8 % (13 U/ha)  
en % de la moyenne (valeur absolue)

### Développement racinaire

