

Couverts végétaux d'interculture

Caractérisation

Espèce : Sorgho

Famille : Graminée

Dose de semis
en pure : 25 kg/ha


Variété : PIPER

PMG (en g) : 23

Bénéfice culture suivante

Céréales :	--
Légumineuses :	+/-
Maïs :	+/-
Betteraves :	+/-

Développement aérien et souterrain



Enracinement : Fasciculé

Aptitude aux semis

Très précoce (avant 30 juillet) :	+
Précoce (30 juillet - 15 août) :	-
Intermédiaire (16 août - 31 août) :	--
Tardif (après 1er septembre) :	--
Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	++
Semis sous la coupe :	++
Semis avec semoir à dents :	++
Semis direct avec semoir à disques sur chaume :	+
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	+
Semis à la volée puis rouleau :	-

Destruction

Gel :	+	Roulage (avant gel) :	++
Broyage :	+	Travail du sol (déchaumage) :	+/-
		Glyphosate :	++

Phénologie

Photos et
résultats
d'essais



Développement foliaire



Développement racinaire



Biomasse : + 130 % (5,2 T de MS/ha)

Source essais VAL'EPI (nb ref : 1)

en % de la moyenne (valeur absolue)