

### Couverts végétaux d'interculture

#### Caratérisation

Espèce : **Vesce commune**

Famille : Légumineuse

Dose de semis  
en pure : **60 kg/ha**


Variété : -

PMG (en g) : 55

#### Bénéfice culture suivante

Céréales :	++
Légumineuses :	-
Maïs :	++
Betteraves :	++

### Développement aérien et souterrain



Enracinement : **Pivot**

### Aptitude aux semis

Très précoce (avant 30 juillet) :	++
Précoce (30 juillet - 15 août) :	++
Intermédiaire (16 août - 31 août) :	+/-
Tardif (après 1er septembre) :	-
Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	+
Semis sous la coupe :	-
Semis avec semoir à dents :	++
Semis direct avec semoir à disques sur chaume :	+
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	-
Semis à la volée puis rouleau :	-

### Destruction

Gel :	+/-	Roulage (avant gel) :	+/-
Broyage :	-	Travail du sol (déchaumage) :	-
		Glyphosate :	-

#### Phénologie

Photos et  
résultats  
d'essais



#### Développement foliaire



#### Développement racinaire



Biomasse : **+/-** **88,3 % (2,9 T de MS/ha)**

Source essais VAL'EPI (nb ref : 1)

en % de la moyenne (valeur absolue)

Restitution d'azote (source MERCI) : **+/-** **88,5 % (21,8 U/ha)**

en % de la moyenne (valeur absolue)