

### Couverts végétaux d'interculture

#### Caractérisation

Espèce : Pois fourrager

Famille : Légumineuse

Dose de semis  
en pure : 100 kg/ha


Variété : ARVIKA

PMG (en g) : 180

#### Bénéfice culture suivante

|                |    |
|----------------|----|
| Céréales :     | ++ |
| Légumineuses : | -  |
| Maïs :         | ++ |
| Betteraves :   | ++ |

### Développement aérien et souterrain



Enracinement : Fasciculé

### Aptitude aux semis

|   |     |
|---|-----|
| Très précoce (avant 30 juillet) :                       | ++  |
| Précoce (30 juillet - 15 août) :                        | ++  |
| Intermédiaire (16 août - 31 août) :                     | +/- |
| Tardif (après 1er septembre) :                          | -   |
| Semis à la volée avant récolte de la culture en place : | +   |
| Semis sous la coupe :                                   | --  |
| Semis avec semoir à dents :                             | ++  |
| Semis direct avec semoir à disques sur chaume :         | +   |
| Autre cas d'utilisation de semoir :                     | ++  |
| Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :     | +/- |
| Semis à la volée puis rouleau :                         | --  |

### Destruction

|           |     |                               |     |
|-----------|-----|-------------------------------|-----|
| Gel :     | +/- | Roulage (avant gel) :         | ++  |
| Broyage : | +/- | Travail du sol (déchaumage) : | +/- |
|           |     | Glyphosate :                  | -   |

#### Phénologie

Photos et  
résultats  
d'essais



Biomasse : - 80 % (3,2 T de MS/ha)  
Source essais VAL'EPI (nb ref : 1) en % de la moyenne (valeur absolue)

#### Développement foliaire



Restitution d'azote (source MERCI) : ++ 165,5 % (48 U/ha)  
en % de la moyenne (valeur absolue)

#### Développement racinaire

