

Couverts végétaux d'interculture

Caratérisation

Espèce : **Nyger**

Famille : Composée

Dose de semis
en pure : **8 kg/ha**


Variété : REGYN

PMG (en g) : 3,2

Bénéfice culture suivante

| | |
|----------------|------------|
| Céréales : | +/- |
| Légumineuses : | +/- |
| Maïs : | +/- |
| Betteraves : | +/- |

Développement aérien et souterrain



Enracinement : **Pivot**

Destruction

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------|
| Gel : | ++ | Roulage (avant gel) : | ++ |
| Broyage : | + | Travail du sol (déchaumage) : | + |
| | | Glyphosate : | +/- |

Aptitude aux semis

| | |
|---|------------|
| Très précoce (avant 30 juillet) : | +/- |
| Précoce (30 juillet -15 aout) : | - |
| Intermédiaire (16 aout - 31 aout) : | - |
| Tardif (après 1er septembre) : | -- |
| Semis à la volée avant récolte de la culture en place : | + |
| Semis sous la coupe : | +/- |
| Semis avec semoir à dents : | + |
| Semis direct avec semoir à disques sur chaume : | +/- |
| Autre cas d'utilisation de semoir : | ++ |
| Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage : | +/- |
| Semis à la volée puis rouleau : | - |

Phénologie

Photos et
résultats
d'essais



Développement foliaire



Développement racinaire



Biomasse : **+** **142,5 % (5,7 T de MS/ha)**
 Source essais VAL'EPI (nb ref: 1) en % de la moyenne (valeur absolue)