

Identification, nuisibilité & dégâts

Ceutorhynchus piciparsis Gyll.



L'adulte

Coléoptère au corps noir de 2,5 à 3,7 mm, tâches latérales blanches, extrémités des pattes rousses



Dégâts : pas de dégâts au stade adulte, c'est la larve qui est préjudiciable



Stade de sensibilité : à surveiller jusqu'au décollement du bourgeon terminal (stade C2)



Seuil : Risque dès lors que sa présence est détectée et après un délai moyen de 8 à 10 jours (piégeage en cuvette jaune)



A ne pas confondre avec le baris ou le charançon de la tige du chou



La larve


Blanches et opaques de 4,5 à 6,5 mm. Tête brune, tirant sur le noir au premier stade larvaire, puis le jaune. Pas de patte.



Source : Terres Inovia



Dégâts : bourgeon terminal endommagé et apparition de « plantes buissonnantes », disparition de plantes en cas d'attaque grave.



A ne pas confondre avec la larve de grosse altise ou de mouche




Seuil : les dégâts s'observent à la reprise en sortie hiver mais il est déjà trop tard. La lutte doit être réalisée sur les adultes (les larves passent l'hiver dans le cœur des colzas et demeurent intouchables par les insecticides).



Comment différencier les larves des espèces de ravageurs à l'automne sur colza ?



Larve de grosse altise
 1,2 à 8 mm
 3 paires de pattes
 Tête & queue noires
 Corps pigmenté



Larve de CBT
 4,5 à 6,5 mm
 Absence de patte
 Tête brune



Larve de mouche
 3-4 mm
 Absence de patte
 Tête non colorée