

Couverts végétaux d'interculture

Caratérisation

Espèce : Moutarde blanche tardive

Famille : Crucifère

Dose de semis
en pure : 9 kg/ha


Variété : VERTE, Anti nématode : TOPAS

PMG (en g) : 7

Bénéfice culture suivante

Céréales :	+
Légumineuses :	-
Maïs :	+/- AN = variété anti-nématodes
Betteraves :	++ AN ++

Développement aérien et souterrain



Enracinement : Pivot

Aptitude aux semis

Très précoce (avant 30 juillet) :	-
Précoce (30 juillet - 15 août) :	+
Intermédiaire (16 août - 31 août) :	++
Tardif (après 1er septembre) :	+
Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	++
Semis sous la coupe :	++
Semis avec semoir à dents :	++
Semis direct avec semoir à disques sur chaume :	+
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	+
Semis à la volée puis rouleau :	+/-

Destruction

Gel :	+/-	Roulage (avant gel) :	++
Broyage :	++	Travail du sol (déchaumage) :	+
		Glyphosate :	+/-

Phénologie

Photos et
résultats
d'essais



Biomasse : + 125,6 % (4,2 T de MS/ha)
Source essais VAL'EPI (nb ref : 3) en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement foliaire



Restitution d'azote (source MERCI) : + 122,2 % (30,1 U/ha)
en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement racinaire

