

Couverts végétaux d'interculture

Caratérisation

Espèce : Féverole de prts

Famille : Légumineuse

Dose de semis
en pure : 150 kg/ha


Variété : -

PMG (en g) : 525

Bénéfice culture suivante

| | |
|----------------|----|
| Céréales : | ++ |
| Légumineuses : | - |
| Mais : | ++ |
| Betteraves : | ++ |

Développement aérien et souterrain



Enracinement : Pivot

Destruction

| | | | |
|-----------|-----|-------------------------------|-----|
| Gel : | +/- | Roulage (avant gel) : | ++ |
| Broyage : | +/- | Travail du sol (déchaumage) : | +/- |
| | | Glyphosate : | - |

Aptitude aux semis

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Très précoce (avant 30 juillet) : | ++ |
| Précoce (30 juillet -15 août) : | ++ |
| Intermédiaire (16 août - 31 août) : | +/- |
| Tardif (après 1er septembre) : | - |

| | |
|---|-----|
| Semis à la volée avant récolte de la culture en place : | - |
| Semis sous la coupe : | -- |
| Semis avec semoir à dents : | ++ |
| Semis direct avec semoir à disques sur chaume : | + |
| Autre cas d'utilisation de semoir : | ++ |
| Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage : | +/- |
| Semis à la volée puis rouleau : | -- |

Phénologie

Photos et
résultats
d'essais



Biomasse : +/- 92,5 % (3,7 T de MS/ha)

Source essais VAL'EPI (nb ref : 1) en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement foliaire



Restitution d'azote (source MERCI) : ++ 182,8 % (53 U/ha)

en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement racinaire

