

### Couverts végétaux d'interculture

#### Caratérisation

Espèce : Trèfle d'Alexandrie

Famille : Légumineuse

Dose de semis  
en pure : 15 kg/ha


Variété : SANIROS, ALEX

PMG (en g) : 3

#### Bénéfice culture suivante

Céréales :	++
Légumineuses :	-
Mais :	++
Betteraves :	++

### Développement aérien et souterrain



Enracinement : Pivot

### Destruction

Gel :	+/ -	Roulage (avant gel) :	+
Broyage :	-	Travail du sol (déchaumage) :	+/ -
		Glyphosate :	+/ -

### Aptitude aux semis

Très précoce (avant 30 juillet) :	+/ -
Précoce (30 juillet - 15 août) :	+/ -
Intermédiaire (16 août - 31 août) :	-
Tardif (après 1er septembre) :	-

Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	++
Semis sous la coupe :	-
Semis avec semoir à dents :	+
Semis direct avec semoir à disques sur chaume :	+/ -
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	+/ -
Semis à la volée puis rouleau :	+/ -

#### Phénologie

Photos et  
résultats  
d'essais



Biomasse : **+/ -** 95 % (3,8 T de MS/ha)  
Source essais VAL'EPI (nb ref : 1) en % de la moyenne (valeur absolue)

#### Développement foliaire



#### Développement racinaire



Restitution d'azote (source MERCI) : **+/ -** 100 % (29 U/ha)  
en % de la moyenne (valeur absolue)