

## Couverts végétaux d'interculture

### Caratérisation

Espèce : Chia

Famille : Lamiacée

Dose de semis  
en pure : 5 kg/ha


Variété : LAMI

PMG (en g) : 1,3

### Bénéfice culture suivante

|                |   |
|----------------|---|
| Céréales :     | + |
| Légumineuses : | + |
| Mais :         | + |
| Betteraves :   | + |

### Développement aérien et souterrain



Enracinement : Fasciculé

### Destruction

|           |    |
|-----------|----|
| Gel :     | ++ |
| Broyage : | ++ |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Roulage (avant gel) :         | ++ |
| Travail du sol (déchaumage) : | ++ |
| Glyphosate :                  | +  |

### Aptitude aux semis

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Très précoce (avant 30 juillet) :   | ++ |
| Précoce (30 juillet - 15 août) :    | ++ |
| Intermédiaire (16 août - 31 août) : | -  |
| Tardif (après 1er septembre) :      | -  |

|   |    |
|---|----|
| Semis à la volée avant récolte de la culture en place : | ++ |
| Semis sous la coupe :                                   | ++ |
| Semis avec semoir à dents :                             | +  |
| Semis direct avec semoir à disques sur chaulage :       | ++ |
| Autre cas d'utilisation de semoir :                     | ++ |
| Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :     | ++ |
| Semis à la volée puis rouleau :                         | +  |

### Phénologie

Photos et  
résultats  
d'essais



Biomasse : +/- 87,5 % (3,5 T de MS/ha)

Source essais VAL'EPI (nb ref : 1)

en % de la moyenne (valeur absolue)

### Développement foliaire



Restitution d'azote (source MERCI) : -- 48,3 % (14 U/ha)

en % de la moyenne (valeur absolue)

### Développement racinaire

